

# 接種「復必泰二價疫苗<sup>1</sup>」的補充資料

<sup>1</sup>復必泰原始株 / Omicron 變異株 BA.4-5 (15 / 15 微克/劑) 注射用分散體  
COVID-19 mRNA 二價疫苗 (核苷修飾)

復必泰原始株 / Omicron 變異株 BA.4-5 二價疫苗 (下稱復必泰二價疫苗) 是一種適用於預防由 2019 冠狀病毒引起的 2019 冠狀病毒病的疫苗，供成人和 12 歲及以上的青少年接種。根據現有臨床數據，受試者於完成基礎疫苗接種後接種復必泰二價疫苗或原始株疫苗作為加強劑後，接種復必泰二價疫苗後所產生針對 Omicron 變異株 BA.4-5 的抗體水平及增幅都較接種原始株疫苗為高。安全性方面，臨床及海外接種數據均顯示復必泰二價疫苗和原始株疫苗的安全性相若。

自 2022 年 12 月 1 日起，復必泰二價疫苗可供 12 歲或以上合資格人士使用。

詳情請參閱網頁「我應接種多少劑新冠疫苗？」，網址

<https://www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/recommendedDoses>。

**接種方式：**在一般情況下，醫護人員會安排在您上臂肌肉內注射 0.3 mL 復必泰二價疫苗。本地專家尤其建議青少年於大腿前外側中段部位以肌肉注射方式接種，但尊重選擇在上臂注射的個人意願。

**注意事項：**接種復必泰後，出現心肌炎 (心臟肌肉發炎) 和心包炎 (包圍心臟的外膜發炎) 的風險會增加。這些個案非常罕見，主要發生在接種後的兩星期內，和更常出現於接種第 2 劑疫苗後及年輕男士身上。接種疫苗後，請注意有否出現心肌炎和心包炎的徵兆，如氣促、心悸和胸口痛。一旦出現這些徵兆，請立即向醫護人員求助。青少年及年輕人在接種復必泰疫苗後一星期內應避免劇烈運動。

**可能出現的副作用：**與所有疫苗一樣，復必泰二價疫苗可能引起副作用，但並非所有人均會出現副作用。有關二價疫苗可能引起的副作用與復必泰原始株疫苗相若<sup>2</sup>，詳情請參考 [復必泰疫苗接種須知](#)。

<sup>2</sup>根據藥廠提供資料

---

## 復必泰二價疫苗所含的成份

---

- 活性物質為 COVID-19 mRNA 疫苗。每小瓶含 6 個 0.3 mL 劑量，每劑含 15 微克 mRNA 原始株及 15 微克 mRNA Omicron 變異株 BA.4-5。
- 如果您曾對疫苗的活性物質或其他成分 (如下列所示) 有過敏反應，不應接種復必泰二價疫苗。

[ (4-羥丁基) 氮雜二基 ] 雙 (己烷-6,1-二基) 雙 (2-己基癸酸酯)(ALC-0315) /  
2-[ (聚乙二醇)-2000 ]-N, N-二十四烷基乙醯胺 (ALC-0159) /  
1, 2-二硬脂醯-sn-甘油-3-磷酸膽鹼 (DSPC) /  
膽固醇 / trometamol / trometamol hydrochloride / 蔗糖 / 注射用水

---

版本日期：2022年12月8日